Grupo 5 - Raízes e Tubérculos

Essas culturas são cultivadas a partir de estacas, não de sementes, por isso toleram o Moccasin 96 EC aplicado no solo, desde que sejam plantadas fundo o suficiente.



Batata-doce

- Aplique antes do plantio
- Plante fundo — pelo menos 3 nós abaixo da superfície do solo
- Após o plantio: aplique entre as linhas depois de 7 dias



Mandioca

- Aplique de 2 a 3 dias antes do plantio
- Pode pulverizar por cima logo após o plantio, somente
- NÃO pulverize quando as folhas novas começarem a emergir

TIRIRICA? O Moccasin 96 EC mata as folhas da tiririca à medida que emergem. Para melhores resultados, are primeiro para danificar os tubérculos e depois aplique.

ANTES DE PULVERIZAR CONHEÇA ESTAS REGRAS

Sem Surfactante

Nunca adicione surfactante, óleo agrícola ou espalhante ao tanque. Isso força o produto através da folha e danifica a cultura.

Precisa de Umidade

Aplique com o solo úmido ou irrigue levemente após pulverizar. Solo seco impede que o produto forme sua barreira contra as plantas daninhas.

Solos Arenosos

Reduza a dose em solos grossos ou arenosos. O Moccasin 96 EC lixivia rapidamente para baixo e pode atingir as raízes da cultura.

Dose de Aplicação
20 ml (4 colheres de sopa) por galão




Atendemos às Suas Necessidades Agrícolas
Caribbean Chemicals Guyana Ltd
45 Croal Street, Stabroek, Georgetown, Guiana

+592 225-4178
+592 225-9639

Mensagem no WhatsApp
+592 743-4769

UPL | Caribbean chemicals GUYANA LIMITED



MOCCASIN 96 EC

Controle residual confiável de plantas daninhas
Para um estabelecimento mais forte da cultura

UPL | Caribbean chemicals GUYANA LIMITED

O Moccasin 96 EC atua na camada superficial do solo. Atinge as plantas daninhas na germinação — antes de emergirem. Aplique corretamente para atingir a planta daninha, e não a cultura.

GRUPO 1 - Seguro para Pulverizar por Cima

Essas culturas são fortes o bastante para suportar a aplicação direta depois de estabelecidas.



Milho

- Plante a semente e aplique
- Certifique-se de que a semente esteja bem enterrada antes de pulverizar
- Pode ser usado com a cultura em crescimento — até 40 polegadas (1 m) de altura



Repolho / Pak choi — Tomate / Pimentão

- Antes do transplantio: aplique 1 a 3 dias antes de plantar as mudas
- Após o transplantio: aguarde 7 a 10 dias até as raízes e folhas endurecerem
- Não pulverize por cima se as plantas estiverem estressadas, molhadas ou sob sol forte.

Grupo 2 - Só no Solo. Não Pulverize a Planta

Essas culturas toleram o produto no solo, mas suas folhas são delicadas demais para a pulverização direta.



Berinjela

- NÃO pulverize por cima — nunca
- Aplique somente entre as linhas, usando pulverizador com protetor



Aipo e Alface

- Não pulverize por cima
- Aplique somente antes do transplantio
- Raízes bem abaixo da superfície do solo
- No transplantio, evite solo superficial na cova

Grupo 3 - Não Recomendado

Quiabo, Bora, Melancia, Pepino, Abóbora, Caraili. Culturas muito sensíveis: alto risco de danos ao caule e perda da lavoura. Evite o uso ou consulte seu representante da CCG antes de aplicar.

Grupo 4 - Culturas Perenes e Frutíferas

Aplique no solo. Mantenha a pulverização longe da planta o tempo todo.



Maracujá

- Aplique somente no solo descoberto
- NÃO deixe a pulverização atingir as folhas



Banana, Banana-da-terra e Mamão

- Aplique somente no solo descoberto
- Evite a pulverização nos caules jovens
- Mamão: aguarde 14 dias após plantar



Árvores Frutíferas Adultas

- Aplique sob a copa da árvore
- Evite pulverizar frutos e folhas